

Note

Reacțiile alergice

- Unele persoane au reacții alergice la medicamentele împotriva HIV. Reacțiile alergice apar în primele zile sau săptămâni în care încep să ia pastilele. Acest lucru se poate întâmpla în mod special cu medicamentele numite abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) și nevirapină (Viramune).
- Cea mai des întâlnită reacție alergică este erupția pe piele, dar doctorul tău îți poate da mai multe informații despre semnele la care trebuie să fii atent. Dacă ai o reacție alergică e foarte important să mergi la medicul tău imediat.

Vrei să afli mai multe?

- Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
- Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: [@BaylorRomania](https://www.facebook.com/BaylorRomania) sau [@FundatiaBaylor](https://www.facebook.com/FundatiaBaylor)
- Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: <https://twitter.com/BaylorRomania>
- Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
- Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: numărul de telefon **0241691730** sau la adresa de email secretariat@baylor.ro




Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor. Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru persoanele care trăiesc cu HIV din România.

Copyright © NAM 2017
www.aidsmap.com

nam aidsmap

Informații de bază

Efecte secundare



Medicamentele împotriva HIV țin virusul HIV sub control dar pot să te afecteze și în alt mod. Orice urmări neașteptate sau nedorite ale luării medicamentelor se numesc efecte secundare.

Efectele secundare care durează puțin

Efectele secundare apar, de obicei, din cauza faptului că ți se obișnuiește corpul cu un nou medicament. După câteva săptămâni, de regulă, aceste efecte secundare dispar.

● Diareea



● Te simți rău



● Oboseală



● Dormi prost




De obicei poți să iei alte medicamente care să te ajute să treci peste aceste efecte secundare. Unele persoane observă că aceste efecte secundare nu trec. Dacă e și cazul tău, trebuie să vorbești cu medicul tău despre schimbarea tratamentului.


Efectele secundare care durează o perioadă lungă de timp

Efectele secundare care să îți afecteze sănătatea o perioadă lungă de timp sunt rare.


● Asigură-te că la clinica la care mergi ți se fac regulat analize din care să reiasă starea ficatului, a rinichilor și a oaselor, ca să se vadă dacă totul e în regulă.



● De asemenea ar trebui să ți se mai facă analize care să arate nivelul colesterolului și a glucozei. Nivele mari ar putea însemna că ai un risc mai mare să faci boli de inimă, diabet, hipertensiune sau atac de cord.



● Schimbări ale formei corpului tău (pierzi sau pui grăsime în anumite părți ale corpului) sunt mult mai rare decât în trecut. Acum medicii încearcă să evite folosirea medicamentelor care duceau la apariția acestor probleme.



Atunci când o analiză nu e bună poți să-ți schimbi obiceiurile nesănătoase, să iei medicamente prescrise de medic sau să vorbești cu medicul tău despre schimbarea tratamentului împotriva HIV.

Reține

- Cel mai des întâlnite efecte secundare durează puțin și poți să iei medicamente care să te ajute să treci peste ele.
- Efectele secundare care să țină mult timp sunt rare.
- Dacă efectele secundare te deranjează, vorbește cu medicul tău despre ele. S-ar putea să fie posibil să îți schimbe tratamentul.