

NAM  
Acorn House  
314-320 Gray's Inn Road  
London  
WC1X 8DP  
Phone: 020 7837 6988  
Website: [www.aidsmap.com](http://www.aidsmap.com)  
Email: [info@nam.org.uk](mailto:info@nam.org.uk)  
Charity number: 1011220

Thanks to all of the professionals and people with HIV who have helped us  
to develop this leaflet.

## REZISTENCIJA NA LEKOVE

This leaflet is available in large format as a PDF.  
Call NAM on 020 7837 6988.



Second edition 2017  
Due for review in 2020  
Copyright ©NAM  
If you need extra copies of this leaflet, or would like to  
translate, adapt or reproduce it, please contact us.

### Beleške

Moguće je imati rezistenciju na lekove čak i bez prethodnog uzimanja lekova tako što Vam HIV može preneti osoba koja već ima rezisenciju virusa na lekove.

### ŽELITE LI DA SAZNATE VIŠE?

Za više informacija o HIV-u, možete da posetite website [www.aidsmap.com](http://www.aidsmap.com)

Možete da nas kontaktirate kako biste dobili informacije o istraživanjima kojima je dokazano ovo što čitate na ovom prospektu.

Preporučujemo da razgovarate sa Vašim lekarom o informacijama na ovom prospektu.

Ako je HIV rezistentan, to znači da neki lekovi na njega ne deluju.

1 Svaki dan HIV pokušava da se umnoži u organizmu i da inficira druge ćelije.



2 AntiHIV lekovi ovo zaustavljaju. Da bi se to ostvarilo, morate da uzimate odgovarajuću količinu lekova, redovno, i uvek u isto vreme.



3 Ako zaboravite da uzmete terapiju ili je uzmete kasnije nego što bi trebalo, HIV će se tada umnožiti u Vašem organizmu u inficirati druge ćelije. Na taj način, HIV može da postane otporan na lekove.



4 I Ako HIV postane otporan, lekovi koji uzimate više nemaju efekta. To znači da ako i uzmete terapiju, HIV će i dalje moći da se umnožava i da inficira druge ćelije, samim tim će ga biti više u organizmu.



5 Ako se ovo desi, morate da promenite terapiju.



Sledeća kombinacija lekova koja Vam se prepiše u slučaju otpornosti, možda neće biti tako efikasna i imaće više neželjenih dejstava.

## VAŽNO

I Važno je da terapiju uzimate tačno onako kako Vam je propisano. Ako ne budete tako činili, HIV može da postane otporan.

II Ako HIV postane otporan, neki lekovi neće delovati više.

III Ako imate rezistenciju na lekove, potrebno je da Vam se promeni terapija.